

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>1- GENERALIDADES</p> <p>Y</p> <p>CLASIFICACIÓN MIASMÁTICA</p>	<p>-Nosode preparado especial/ de una muestra de cáncer de mama</p> <p>-Se toma una porción del tejido canceroso y se diluye en cuatro partes de alcohol de 90° y a partir de esto se hace la tintura madre</p> <p>-Tiene especial acción sobre la esfera mental, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, digestivo, genito-urinario y en las extremidades</p> <p>• 2-1-3.</p>	<p>-Nosode preparado con el gonococo. [virus gonorreico] concepto de los antiguos.</p> <p>-Las dinamizaciones se hacen siguiendo el método habitual, partiendo de una dilución líquida de un flujo gonorreico.</p> <p>-Actúa especialmente sobre la piel, las mucosas, las serosas, el sistema osteo-articular, el genito-urinario y la sangre.</p> <p>• 2-1-3.</p>	<p>-Nosode preparado con la serosidad de vesículas de sarna.</p> <p>-Las dinamizaciones se hacen siguiendo el método habitual, partiendo de una dilución líquida de la serosidad de vesículas de sarna.</p> <p>-Actúa especialmente sobre la piel, las mucosas, las serosas y la sangre.</p> <p>• 1-2-3</p>	<p>-Nosode preparado con la serosidad de un chancro sifilítico.</p> <p>-Las dinamizaciones se hacen siguiendo el método habitual, partiendo de una dilución líquida de la serosidad de un chancro sifilítico.</p> <p>-Actúa especialmente sobre el sistema nervioso central, el sistema osteo-articular, el sistema genito-urinario y la piel.</p> <p>• 3-1-2</p>	<p>-Nosode preparado con la Tuberculina de Koch.</p> <p>-Las dinamizaciones se hacen siguiendo el método habitual, partiendo de una dilución líquida de un extracto glicerinado de cultivos puros de Bacilo de Koch.</p> <p>-Actúa especialmente sobre las mucosas, las serosas, la piel y la sangre.</p> <p>• 2-1-3</p>
<p>2- HUMOR - CARACTER</p>	<p>-Irritable (1): por la mañana después de levantarse (1), por bagatelas (1), por concentración difícil (*) (1), o porque es olvidadizo (*) (3); “en lugares que haya mucha gente” (1) o “durante los dolores (1)</p> <p>-Se encoleriza o disgusta (2) especialmente por sus errores (2). “Cólera con inconformidad (2), fastidio (2), el coraje le dura largo tiempo (2-3). Cólera agresiva con injurias, ironías y sarcasmos (2-3)”.</p> <p>-Intolerante a la contradicción (2).</p> <p>-Malhumor, dispuesto a enojarse (3) Patea en el sueño (3). Se muerde los dedos o las uñas (3).</p> <p>-Es muy sensible a los reproches (2), OFENDIÉNDOSE CON GRAN FACILIDAD (2), tomando todo a mal (2).</p> <p>-Presuroso (2), laborioso especialmente antes de la menstruación (2-1). Mejoría por la ocupación (2). Hace muchos planes (2).</p> <p>-Impaciente (2).</p> <p>-Terco (1).</p> <p>-Fastidioso (1).</p> <p>-Caprichoso (2).</p> <p>-No dictatorial.</p> <p>-Inconforme (2). Inconstante (1).</p>	<p>-SE IRRITA (1): solamente de día (1), o de 12 p.m. a 3 a.m. (*) (3); por SUTILEZAS (1), durante los escalofríos (1), estando en una habitación oscura (*), o leyendo (1); o se siente alegre al anochecer (1-2), por la NOCHE (3) y la alterna con tristeza (2-1).</p> <p>-Su humor es alternante (2), variable (2). Se encoleriza al leer o escribir (*). Es quisquilloso, difícil de contentar (2). Insolente (2-3).</p> <p>-Malhumorado (3) de día (1), rabioso (3), le da rabia por leer o escribir (*) (3).</p> <p>-Susceptible.</p> <p>-APURADO (2) por bagatelas, PRECIPITADO (2), AGITADO (2), ATAREADO (2), impetuoso (2) e impulsivo, cree que todo se mueve lentamente (2), sintiéndose > al anochecer.</p> <p>-Impaciente.</p> <p>-No terco.</p> <p>-Fastidioso.</p> <p>-Caprichoso.</p> <p>-Dictatorial.</p> <p>-No inconforme. No inconstante</p>	<p>- Se IRRITA (1): fácilmente, sin causa (*) (3), de día y noche (1-3), por la mañana (1), al anochecer (2), por la noche (3) [en los bebés enfermos (*)] o [al despertar de noche (3)]; o al despertar (3) en general.</p> <p>-Su humor es alternante (2), variable (2). Se encoleriza (2) con las AFECCIONES ABDOMINALES (*) o por un acceso de tos (3).</p> <p>- Su humor es REPULSIVO (3), inamistoso (3), malhumorado (3) por la noche (3), durante la menopausia (*) (2) y en los niños.</p> <p>-SUSCEPTIBLE por bagatelas (2).</p> <p>-No es presuroso.</p> <p>-Impaciente.</p> <p>-Terco.</p> <p>-No fastidioso.</p> <p>-No caprichoso.</p> <p>-No dictatorial.</p> <p>-Inconforme – No inconstante</p>	<p>-Se irrita fácilmente (1) y más DURANTE LA CEFALEA (2) y los escalofríos (1). Es terco.</p> <p>-Su humor es alternante o cambiante (2). se encoleriza fácilmente (2), más si lo contradicen (2), no quiere que lo calmen (2). Tiembla cuando se encoleriza (2).</p> <p>-Agresivo (3) aún con enemigos más fuertes, lo importante es destruir o ser destruido (3). Es malhumorado (3), peleonero (3).</p> <p>-Susceptible.</p> <p>-Presuroso.</p> <p>-No impaciente.</p> <p>-Terco.</p> <p>-No Fastidioso.</p> <p>-No caprichoso.</p> <p>-No dictatorial.</p> <p>-Inconforme. – Inconstante.</p>	<p>-Muy IRRITABLE (1), quiere reñir (3), no vacila en arrojar cualquier cosa a uno, aún sin motivo (3). IRRITABLE AL DESPERTAR (1-3). NADA PUEDE COMPLACERLE, NADA LE SATISFACE (3).</p> <p>Una simple bagatela le produce intensa irritación y no se puede sustraer de ella (1-3). Irritación nerviosa con aversión al trabajo físico o mental (1-3). Irritabilidad con aversión al trabajo físico y mental (*) (1-3). No le gusta que lo inoportunen o estorbe la gente (*) (2).</p> <p>-Se encoleriza súbitamente, x bagatelas, violenta/, arrojando cosas (2-3).</p> <p>- Es de un humor muy variable o alternante (2): se siente alegre o feliz (1) o bien melancólico y triste (1). Es suave (1) y dulce (1) o se pone MUY IRRITABLE (1) o gritón (2).</p> <p>-SUSCEPTIBLE.</p> <p>-No es presuroso.</p> <p>-No impaciente.</p> <p>-Terco.</p> <p>-No fastidioso.</p> <p>-Caprichoso.</p> <p>-No dictatorial.</p> <p>-No inconforme. No inconstante</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>2- HUMOR - CARACTER (continuación)</p>	<p>-Sufre de trastornos por ANTICIPACION (2); vive anticipando los acontecimientos con ansiedad (2-1), y frecuentemente antes de que deban suceder (2). Anticipación con preocupación y angustia (2-1-3); la llegada tarde del esposo, esposa o hijo (2). Anticipación y miedo a fracasar antes de un examen (2). Indeciso para elegir las cosas (*) (2).</p> <p>-Tiene trastornos por: cólera (2) [cólera silenciosa con pena (2-1)], temor (2), susto (2), pena (1), reproches (1-2), o por la grosería o rudeza de los otros (1). Trastornos por: emociones suprimidas (1), pena (1). Se agrava después de la risa (*) (1).</p> <p>-Es fastidioso (2), exigente (2); minucioso (1-2), detallista (2), ordenado en exceso [Ars.], muy pulcro (2), elegante (2) y limpio (2). Vanidoso (2). Desea ser adulado (2). Indeciso en la elección de las cosas (*) (2). Sociable (2).</p> <p>-Prudente (1), revisa dos o mas veces lo que hace (1). Curioso (1-2). Deseo de armonía (1).</p> <p>-Tímido (1), inseguro (1-2) > junto al mar (*) y dócil (1) Dulce (1). Educado (1). Se < por conversar (1). Reservado (1). Resignado (1).</p> <p>-Rencoroso (3). Resentimiento, rencor sobre cosas pasadas y con deseos de vengarse.</p> <p>-Se < por el consuelo (3) o por la música (3).</p>	<p>-Vive excitadamente y con mucha ANTICIPACIÓN (2) por cualquier acontecimiento futuro, cercano o lejano, lo que le pueden desencadenar gran ansiedad (1), como una cita, compromiso, o un gran temor de los actores antes de actuar (2) [temor escénico]; otras veces llega a tener presentimientos, incluso de su muerte, por una especial sensibilidad a captar hechos antes de que ocurran [CLARIVIDENCIA (2)], y “que general/ son correctos” [Allen]. PROFETIZA ACONTECIMIENTOS DESAGRADABLES (*) (2). Supersticioso (2). En contraposición de todo lo anterior también pueden dejar todo para el otro día (1) o es distraído (2), o nunca acaba lo que inicia (2) [inconstancia]. No persiste en nada (2). Aplaza y difiere sus negocios (*) (1).</p> <p>-Trastornos emocionales por: ANTICIPACIÓN (2), excitación emocional (2), egotismo (2) o temor (2). Todas sus impresiones y padecimientos ESTÁN < CUANDO PIENSA EN ELLAS (1).</p> <p>-Tímido de aparecer en público (1), inseguro (1-2). Reservado (1). Concienzudo por bagatelas (1).</p> <p>-Avaro (2), fanfarrón (2), egotista (2), ególatra (2) y celoso (2).</p> <p>-Rencoroso. Brusco (3-1), áspero o terminante (3-1), tiene que contenerse para no insultar (3). Es salvaje (3), cruel (3) e inhumano (3).. Se golpea la cabeza contra la pared o las cosas (3). Mutila su cuerpo (3), se muerde las uñas (3), o la punta de la lengua durmiendo (*) (3). Desea halar su propio cabello o el de alguien. (2-3).</p>	<p>-Padece de trastornos de origen emocional por una ANTICIPACIÓN (2). Por la noche (3) o al despertar (3).</p> <p>-Trastornos mentales después de un esfuerzo mental (1) [que lo < en general (1) o le tiene aversión (3)]. Por una excitación emocional o sexual (2).</p> <p>-Alterna: manía con depresión (2-1), jovialidad con llanto (2-1), juego con tristeza (*) (2-1), viveza con tristeza (2-1).</p> <p>-Perezoso (1), deseando permanecer en la cama todo el tiempo (1) o hasta el medio día (*) (1).</p> <p>-No es tímido. Inseguro.</p> <p>-No es rencoroso.</p> <p>-Peleador (3) por la mañana (1) o al anochecer (2). Violento (3) por la mañana (1).</p> <p>-Intolerante (2). Atormenta a todo el mundo con sus lamentos (3-2).</p>	<p>-No tiene trastornos de origen emocional.</p> <p>-No es tímido ni inseguro.</p> <p>-Agresivo (3) aún con enemigos más fuertes, lo importante es destruir o ser destruido (3). Pudiendo llegar al homicidio o al suicidio (3). Es insultante (2), golpea CON LA CABEZA (*) y con los puños (*), la pared (*) (3), desea matar (3).</p> <p>-Mentiroso (2), nunca dice la verdad, no sabe lo que ella está diciendo (3).</p> <p>-Rencoroso.</p> <p>-Es ALCOHÓLICO (3) por su tendencia a la destrucción, llegando a ser el alcohólico más difícil de curar.</p> <p>-LAS PALABRAS AMABLES, el CONSUELO, la simpatía o la compasión le agravan sus síntomas. (3).</p>	<p>-No tiene trastornos de origen emocional.</p> <p>-No es tímido ni inseguro.</p> <p>- Callado (1). Dulce (1).</p> <p>-Vive ESPERANZADO (2), aún a pesar de estar muy enfermo (2-3).</p> <p>-RENCOROSO y llega a destruir, blasfemar o insultar a las personas que lo han ofendido (3).</p> <p>- Arroja cosas sin razón (*) (3)</p> <p>-Atormentado (3), con pensamientos persistentes durante la noche (2-3). Los pensamientos lo atormentan y atropellan durante la noche (2-3).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
4- INTELLECTO	<p>-Su memoria es débil (1) para lo que va hacer, o para las cosas cotidianas (1).</p> <p>-Contesta con monosílabos (1). Se < por conversar (1).</p> <p>-Confusión mental (2) o embotamiento (1).</p> <p>-Intranquilidad mental (2).</p> <p>-Distraído (2) al leer (2).</p> <p>-Se concentra con dificultad (1).</p> <p>-Comete errores leyendo (3).</p> <p>-Inteligente (2), muy talentoso (*) (2), tiene mucha habilidad para el arte (2). Desean leer mucho (2). Clarividente (2). Cleptómano (2-3).</p> <p>-Sin demencia.</p> <p>-Vive pensando en momentos felices del pasado (*) (1-3).</p>	<p>SU MEMORIA ES MUY DÉBIL (1), para: fechas, hechos, lo que ha escuchado, de SU PROPIO NOMBRE, NOMBRES PROPIOS; LO QUE HA LEÍDO, dicho o está a punto de decir; para los pensamientos que acaba de tener; de palabras o lo que va a escribir; para cosas insignificantes (*). Se le < sus síntomas mentales leyendo o escribiendo (1).</p> <p>-Olvidadizo (3) suprimiendo las palabras mientras habla, o sale y pierde las compras (3).</p> <p>-Distraído.</p> <p>-Se concentra con dificultad (1), para temas abstractos, está tan confuso, que le impide darse cuenta de su propia identidad</p> <p>-Comete errores (3) al hablar: deletreando, trasponiendo las palabras o usando mal las palabras (3); o de tiempo: confundiendo el presente con el pasado (3); al escribir, o durante la cefalea (*).</p> <p>- Idiocia con masturbación (3-1-2).</p> <p>-Inconciencia transitoria (3), después de orinar (*).</p> <p>-Demencia (3). Manía (3). Esquizofrenia paranoide (3-2).</p> <p>-Postración mental (3) al despertar (3), por el dolor (*) (2) o mientras orina (3).</p> <p>-Tiene muchos pensamientos (2): persistentes (1), RÁPIDOS (2), VELOCES (2), atormentadores (3), incoherentes (3), sexuales de cada mujer que ve (*) (2), que se le desvanecen al hablar (1). Generalmente habla de un solo tema (2-1), o solo de su enfermedad (*) (2). Está lleno de preocupaciones (2).</p>	<p>-Olvidadizo (3) para: eso que ha escuchado (3), los lugares (3) [no reconociendo su propia casa, o no sabe o recuerda su habitación (*)]; lo que ha dicho (3) o leído (3).</p> <p>-Confusión mental [como después de estar embriagado]: al anochecer (2), por la noche (3), al despertar (3), se le < calculando (1) y se le > estando al aire libre (1).</p> <p>- Distraído en el trabajo</p> <p>-Se concentra con dificultad, más calculando (1), o se embotata intelectualmente (1), como si la mitad izquierda de la cabeza fuera estúpida (*) (1), o como después de una orgía (*), antes del medio día (1) y al despertar (3).</p> <p>-Sufre de trastornos mentales después de un esfuerzo mental (1) [que lo < en general (1) o le tiene aversión (3)].</p> <p>-Comete errores (3): de tiempo o de lugares (2).</p> <p>-Demencia.</p> <p>-Inconciencia (coma) (3) especialmente por la mañana (3-1), durante la fiebre (3), la menstruación (3) o el vértigo (3).</p> <p>-</p>	<p>-Es muy olvidadizo (3): no puede recordar los nombres propios de personas que frecuenta o las personas mismas, o fechas, o títulos de libros (*), que ha leído o posee, o nombres de lugares (*) o calles de la ciudad que conoce muy bien. De los sucesos posteriores al comienzo de la enfermedad (*). Para lo que le ha pasado o para personas. Olvida las palabras mientras habla. Su pérdida de la memoria es súbita y periódica.</p> <p>-No es distraído.</p> <p>-Se concentra con dificultad, especialmente para calcular (1). Confusión mental calculando (1).</p> <p>-Comete errores calculando (3-1). -Ineptos para las matemáticas (1). Los niños tienen dificultad para pensar o comprender (1). Confusión mental durante el asma (*) (1-3). Hablan lentamente (1).</p> <p>-Si ha tenido sífilis, recuerda bien los sucesos anteriores a la infección, pero difícilmente los posteriores (3).</p> <p>-Locura megalomaniaca (3).</p> <p>-Imbecilidad (2-1). Siente su mente postrada al despertar. (3) o durante el asma (*) (3).</p> <p>-Afasia (3).</p> <p>-Tiene pensamientos incoherentes (3).</p> <p>-Vive pensando en sucesos desagradables pasados (1-3).</p>	<p>-Memoria débil (1) o pérdida (3), incapaz de pensar o comprender (1). Comprensión y concentración casi imposibles (1). Comprensión difícil: ha de leer varias veces un párrafo antes que pueda comprenderlo (1).</p> <p>-No es distraído</p> <p>-Concentración difícil al estudiar o al leer (1). Embotamiento mental con la cefalea (*). (1).</p> <p>-No comete errores.</p> <p>-Coma (3): profundo que dura tres días con temperatura de 41° (3-2). Pérdida completa del conocimiento, estupor, insensibilidad y respiración estertorosa (3-2).</p> <p>-Inconsciencia durante la fiebre (3).</p> <p>-Locura: aguda o crónica, con antecedentes familiares de tuberculosis (3-2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
4- INTELLECTO (continuación)		<p>-Confusión y embotamiento mental (1), cuando está acelerado (*); en los niños; entendiendo las preguntas solo después de repetírselas y se le < al despertar (3). Tiene DIFICULTAD PARA EXPRESAR SUS SÍNTOMAS (*) (1). Imbecilidad (2-1).</p> <p>-Tiene aversión al trabajo intelectual, porque el esfuerzo mental lo < o le es imposible, y por esto, lo excita o lo irrita al leer o al escribir (1).</p> <p>-Su lenguaje es confuso y no termina las frases (1), PIERDE EL HILO DE LO QUE ESTÁ DICIENDO (*), o no encuentra las palabras al hablar (*).</p> <p>-Aprende a hablar lenta y dificultosa/. Se le dificulta leer por la cefalea (*). Al leer las palabras le parecen extrañas y cree que están mal escritas (*).</p> <p>-Habla tranquilamente de la muerte (*).</p> <p>-Contesta las preguntas que le hagan cuando está durmiendo</p> <p>-Vive lleno de pensamientos o preocupaciones, persistentes, desagradables, horribles, de cosas desagradables del pasado.</p>			

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>4- INTELLECTO. (continuación)</p>	<p>-No tiene delirios.</p>	<p>-Cree que: SE VOLVERÁ LOCO, TODO LE PARECE IRREAL, que la vida fuera irreal (*); que los objetos son dobles; que está embriagado; que camina sobre las rodillas; que sus piernas están cortadas; que las cosas que pasan han ocurrido hace una semana (*); que alguien habla, o está detrás de él, que ha sido perseguido; que alguien camina detrás de él; que camina de rodillas (*); de objetos imaginarios que se arrastran por todo su cuerpo (*); que habla con muertos; las cosas familiares le parecen extrañas; que debe hacer algo para liberar su mente de la tortura (*); que los OJOS SE LE SALIESEN DE SU CABEZA (*). Escucha voces, o que alguien le susurra. -Mira atrás como si alguien lo siguieran (2). Todo le parece extraño o irreal (2), como si estuviera en un sueño (2). Estupefacto (2).</p> <p>-No tiene delirios.</p>	<p>-Delirio (3) especialmente DURANTE LA FIEBRE (3) o por UNA ERUPCIÓN (*) (1).</p>	<p>-Delirios (3) de noche (3) y por la cefalea (2).</p>	<p>-Delirio y síntomas meníngeos graves, consecutivos a una inyección de tuberculina. (3-2).</p>
<p>5- AFECTIVIDAD.</p>	<p>-Es sensible a las reprimendas (2), a la rudeza (2), y a las impresiones sensuales (2). Ama las tormentas eléctricas (*) (2) y se siente mejor después de ellas (2), se alegra con la lluvia y los truenos (1-2). -COMPASIVO (1), con los animales, los ama (1); ama la naturaleza (1); sufriendo de trastornos por una infelicidad (1) y más si es de la otra gente (*) (1). Las historias tristes lo afectan profundamente (1-2). -Gran necesidad de afecto (1), desea ser acariciado (1), mejora estando acompañado (1). -Desea amar (1) y ser muy afectuoso con todos (1).</p>	<p>-No es compasivo.</p> <p>-No es afectuoso.</p>	<p>-No es compasivo.</p> <p>-No es afectuoso.</p>	<p>-No es compasivo.</p> <p>-No es afectuoso.</p>	<p>-No es compasivo.</p> <p>-No es afectuoso.</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
5- AFECTIVIDAD. (continuación)	<p>-No es celoso. -No homosexualidad.</p> <p>-Indiferencia (3) por las personas queridas (3), con aversión (3) a ciertas personas a la conversación, o la música. Los niños le tiene aversión a jugar (3).</p> <p>-Desobediente (3). -Desea estar solo (3).</p> <p>-Rencoroso (3). Resentimiento, rencor sobre cosas pasadas y con deseos de vengarse.</p>	<p>-Celoso (2). -Homosexualidad.</p> <p>-No es indiferente.</p> <p>Aversión (3): a ser tocado; al color negro; a la responsabilidad; a las COSAS AGRADABLES (*), y a la música.</p> <p>-No desobediente. -No desea estar solo.</p> <p>-Rencoroso.</p>	<p>-No es celoso. -No homosexualidad. -Apasionado (3). -INDIFERENTE con tristeza (3-1). Sucio (1-3), con piel sucia, desaseado (3), con aversión a bañarse (3).</p> <p>-DESOBEDIENTE. -Desea estar solo, pues la presencia de las personas lo < (1); vive apartado de su familia (3). -No es rencoroso.</p>	<p>-No es celoso. -No homosexualidad.</p> <p>-Indiferencia: a todo, a las personas amadas, a sus parientes, al futuro.</p> <p>-Indolencia al trabajo físico (1), con aversión a sus negocios (3).</p> <p>-No desobediente. -Desea estar solo.</p> <p>-Rencoroso.</p>	<p>-No es celoso. -No homosexualidad.</p> <p>-Indiferencia.</p> <p>-No desobediente. -No desea estar solo.</p> <p>-RENCOROSO.</p>
6- SENSIBILIDAD	<p>-Es hipersensible (2): a la música [con deseos de llorar (1)], especialmente antes de la menstruación (1), se > por la música (3); con marcado sentido del ritmo y de la DANZA (2), necesitan BAILAR y se > después de hacerlo (2). Niños que les gusta BAILAR (2). [Sep.].</p> <p>-Hace muecas (2), gestos, tics extraños (*) haciendo movimientos involuntarios de las manos golpeando su cabeza con la punta de los dedos (*). (2-3). Se arranca la piel alrededor de las uñas (3). -Grita por la noche o durante el sueño (2-3). -Habla durmiendo (2-3). -Inquieto (2), no se encuentra bien en ningún lugar” (2); desea viajar (2). -Sobresalta (2) por el ruido (2) o por un sueño (2).</p>	<p>-Es hipersensible: al DOLOR [quejidos, por el] , a que lo toquen (2) [le tiene aversión (3)], a los ruidos, lo fastidia la música; a la luz (2); a las reprimendas (2); a las HISTORIAS TRISTES u HORRIBLES; a la rudeza o la grosería de los otros (2-1); a las malas noticias (1) [le producen trastornos]; a la contradicción [que le es intolerante]. IMPRESIONABLE (2). La idea del matrimonio le parece insoportable (2). (3) -Se excita (2) mucho cuando anticipa sus acontecimientos (2), por sutilezas (1), por esfuerzo mental (1); cuando lee (1) o escribe (*) (1). .Desea el color blanco (2).</p> <p>- Se sobresalta FACILMENTE por los ruidos (2), por un sueño o durmiendo</p>	<p>-Es sensible: al DOLOR y a las impresiones morales, a la luz, a los olores, a los ruidos y a los timbres y campanillas. HIPOCONDRIA CON HEMORRAGIA RECTAL (*) -Hace gestos: con las manos, las tuerce o tira la ropa de cama, o DE COGER OBJETOS EN EL AIRE (*) . Se pone tembloroso por una emoción, con transpiración y susto (*) (2). -INQUIETUD (2), ansiosa (1), por la noche (3), durante la fiebre ; antes (*) o durante de las tormentas (2). INQUIETUD EN LOS NIÑOS CON LAS ERUPCIONES (*) (2-1), que se le aumenta en la noche, estando en la mañana llenos de vida (*). -Se sobresalta fácilmente, por bagatelas, como y por susto (2) o por el sueño (3). Grita (2) y habla (2) DURANTE EL SUEÑO (3) y mucho más en los niños.</p>	<p>-Es sensible a los ruidos (2), a la LUZ (2). Se ríe sin causa (2-3).</p> <p>-Inquieto (2) en la NOCHE (3), saltando fuera de la cama (2); durante la cefalea (2). Niños inquietos (2).</p> <p>-Grita por los dolores (2).</p> <p>-Se vive lamentando (3).</p> <p>-No tiene sobresaltos.</p>	<p>-HIPERSENSIBLE A LOS RUIDOS (2) y extremadamente sensible a la música y está mejor por ella. (2). Pensar en sus males lo agrava (1). Sensible al dolor (2).</p> <p>-Es cosmopolita: deseo de viajar constantemente (2).</p> <p>-GRITA (2): por la CEFALEA (*), durante la FIEBRE, cuando sueña o al ACERCARSE UN PERRO (*) -No puede quedarse mucho tiempo quieto en un solo lugar (2). -GRITA (2): por la CEFALEA (*), durante la FIEBRE, cuando sueña o al ACERCARSE UN PERRO (*) -Está propenso a gemir (3) y a quejarse (2) por la más leve causa (1), durante las convulsiones (3). con tristeza (*) (1), o acostado en la cama (*) -Sobresalta al dormirse.</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
7- NIÑOS	<p>-Los niños son: inquietos (2), desean ser mecidos (2), o llevados en brazos (2); caprichosos (2), coléricos (2), precoces (2); inconformes (*) (2); destructivos (*) (3); miedosos (2); que se enferman por la dominación (*) más si ha habido un historial de largo dominio por parte de sus padres (*). “Miedo a otros niños en la escuela, no sabe defenderse”(1) Celos entre niños (2).</p> <p>-Niños que les gusta BAILAR (2).</p> <p>-Tímidos (1), dóciles (1), tristes (1),</p> <p>Llorones (1) [desde el nacimiento (*)], con crecimiento detenido (1).</p> <p>-Embotados (1) que se concentran con dificultad (1).</p> <p>-</p>	<p>-No son inquietos.</p> <p>-Niños: con deficiencias mentales, antecedentes de gonorrea; oligofrénicos (1-3), imbéciles (3-1). Mongolismo (1-3).</p> <p>-No son llorones.</p> <p>-Se concentran con mucha dificultad (1).</p> <p>-</p>	<p>-INQUIETUD EN LOS NIÑOS CON LAS ERUPCIONES (*) (2-1), que se le aumenta en la noche, estando en la mañana llenos de vida (*). El niño está tranquilo y juega de día (1-2), pero está inquieto, molesto y llora toda la noche (2-3).</p> <p>-Gritan y hablan DURANTE EL SUEÑO 2-(3)</p> <p>-El niño está tranquilo y juega de día (1-2), pero está inquieto, molesto y llora toda la noche (2-3).</p> <p>-Niños obstinados que molestan a los que lo rodean (*) (1).</p> <p>-Irritables durante el insomnio (*) (1-3).</p> <p>-Los bebés enfermos se ponen muy irritables x la noche (*) (1-3).</p> <p>-Llorones que se agitan toda la noche (1-2-3).</p>	<p>-Niños inquietos.</p> <p>-Muy llorones desde que nacen (*) (1).</p> <p>- Los niños tienen dificultad para pensar o comprender (1). Confusión mental durante el asma (*) (1-3).</p>	<p>-Los niños son: inquietos, irritables (1), [no tolera que los miren], obstinados (1), impudicos (2), destructores (3), gritones (2) [gritan durmiendo] y sufren de terrores nocturnos (3).</p> <p>-Se asusta fácilmente (2). sobre todo por los perros (2) y los gatos (*) (2); grita despavorido cuando se le acerca un perro (2).</p> <p>-No son llorones.</p>
8- ANSIEDAD (1)	<p>-Ansiedad (1): nocturna (3); por el futuro (1); por los otros (1), por su familia (1), por su salud (1), mientras conduce rápido su automóvil (*) o cuando hay una hora fijada (1). Está lleno de preocupaciones por el futuro (*) (1). Tiene demasiado sentido del deber (1). Remordimientos (1). “Aprehensivo” (1).</p> <p>-</p>	<p>-Tiene gran ansiedad por su salvación (1) [se desespera por su salvación (3)], de conciencia (1), como si hubiera cometido un crimen, con afecciones religiosas (1), creyendo que está condenado o que se va ir al infierno (1). Siente ansiedad cuando hay una hora fijada (1).</p> <p>-Se SIENTE CULPABLE (1), y tiene intensos remordimientos (1) cuando piensa en sus actos que no han sido correctos (1). Se reprocha a sí mismo, pero se enferma si otros lo reprochan o reprenden (1).</p>	<p>-Es demasiado ANSIOSO (1): vive ansioso con un profundo SENTIMIENTO DE CULPA con MALOS PRESENTIMIENTOS (*), no solo por la salvación de su alma (1) [< en la mañana (*)], sino la de su cuerpo, pues duda de su recuperación (1), sobre todo durante la convalecencia. Esto lo hace vivir con una ansiedad por su estado de salud (1) que lo hace sentir siempre mal o fuera de sí (1-3).</p> <p>-Ansioso por su futuro, con un acentuado desaliento y pesimismo viendo todo negro (1).</p>	<p>-No es ansioso.</p>	<p>-ANSIEDAD MARCADA DE NOCHE hasta la media noche (1-3). Ansiedad durante la fiebre y la cefalea (1-2). Ansiedad con humor sombrío y melancolía (1).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>8- ANSIEDAD (1) Y ANGUSTIA (3),</p>	<p>-No sufre de angustia</p>	<p>- Angustia después del sueño (*) (3).</p>	<p>-Su ansiedad se le < de día (1), a la madrugada a las 5 hs. (*) (1), al cerrar los ojos (1), por resfriarse (1), después de comer (3), en el embarazo (3), por la presión en el pecho, con las PALPITACIONES (*) (2), o al conducir (1) y más si lo hace de bajada (1). La ansiedad se le asocia muchas veces de TEMOR (2), TRISTEZA (*) (1) o de MALOS PRESENTIMIENTOS (*) (1). -Gran ANGUSTIA (3), de día (1) de las 5-17 HS., por la mañana, al despertar (*) (3), por la tarde (1); por la noche (3): después de acostarse (*), que lo levanta de la cama y lo hace andar (2) (*). Angustia durante 2 años (*) (3). La angustia se le presenta con: la inquietud (2), los dolores (2) (*) [del pecho (*)], la disnea (3) (*), las PALPITACIONES (*) (2), los lamentos y gemidos (2), la transpiración (*) (2); la opresión en el pecho (*) al acostarse en la noche (*) o al despertar (*) (3). La angustia la despierta antes de la menstruación (*) (3-1); se le < después de comer (3) y se le > mientras come (*) (1).</p>	<p>-Angustia por la tos (*) o durante un ictus de asma (*). (3).</p>	<p>-Gran angustia de su porvenir (3). - Terror y angustia periódicos (3-2). -Angustia, humor sombrío y melancolía (3-1).</p>
<p>9- TEMORES (2)</p>	<p>-De los animales [perros, ranas (*), insectos o arañas]; de enfermedad inminente, cáncer; la salud de sus personas queridas; a estar solo; a la multitud en una calle concurrida (*); cuando camina en una calle concurrida; los extraños; los lugares estrechos [claustrofobia]; la oscuridad; las alturas; los espejos de una habitación; cuando viaje en carro; y a las tormentas. Tiene “miedos y temores antiguos, llegando al terror”(2-3).</p>	<p>- Miedoso (2), con temor a: El INFORTUNIO (1); de que le suceda algo, o alguna cosa horrible; de sueños horribles; al cambio (*); de decir algo incorrecto (*); de la locura; de causar sensación (*); de estar solo por la noche; de la OSCURIDAD; de estar solo; de que alguien esté detrás de él; de que algo se arrastra de las esquinas; de un peligro inminente.</p>	<p>-MIEDOSO (2), vive lleno de temores (2): a estar solo , de que ALGO LE SUCEDA, de una enfermedad inminente, de ser incurable, del CÁNCER, de la meningitis (*); de la muerte [durante los síntomas cardíacos, o cuando está disneico (*)], de los cadáveres; del infortunio, de los malos presentimientos (*).</p>	<p>-Es temeroso: tiene TERROR de la NOCHE (3), porque todos sus padecimientos se le agravan en su transcurso, y son tan terribles y se le hacen tan intolerables que prefiere morir, especialmente por el extremo agotamiento físico y mental que experimenta al despertar en la mañana. (1-3).</p>	<p>-Se asusta fácilmente (2). sobre todo por los perros (2) y los gatos (*) (2); grita despavorido cuando se le acerca un perro (2). Miedo como si algo le fuera a ocurrir (2). Miedo antes de ir al MÉDICO o al DENTISTA (2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>9- TEMORES (2) (continuación)</p>		<p>-Miedo: de la muerte, de una enfermedad incurable o contagiosa, de la sofocación por la noche; de las alturas, de caer; de los fantasmas; de un sitio estrecho [claustrofobia (2)]; de ir a dormir; al despertar; durante los escalofríos y a los gatos. Sin embargo puede ser temerario especialmente para conseguir placer (2).</p>	<p>-Miedo: de la pobreza, del fracaso en los negocios, de una calamidad, de SER DESCUIDADO; de nadar en aguas profundas (*); de las tormentas [antes]; de CAMINAR EN UNA CALLE CONCURRIDA.</p>		<p>- Terror y angustia periódicos (3-2). Muy inquieto de noche si se despierta (2-3). Todo cuanto hay en la habitación le parece extraño, como si se estuviera en un extraño paraje (2).</p>
<p>10- TRISTEZA (1) Y LANTO (1)</p>	<p>-Es triste (1), taciturno (1).</p> <p>-Deseando llorar todo el tiempo (1), por bagatelas o admonición; cuando los corrigen, o habla de su enfermedad y por la música. “Apatía (1) falta de interés por las cosas que antes le importaban” (1)</p>	<p>-Está triste: al anochecer (2), por una palabra dura (*), el desorden (*), un dolor renal (*) las poluciones (2), o después del sueño (*); con disposición suicida (3); se le > llorando.</p> <p>-Llora MIENTRAS HABLA de su enfermedad y relata sus síntomas (1), no puede hablar sin llorar (1), y también cuando le hablan, y se siente mucho mejor después de llorar (1). LLANTO DURANTE LA DEFECACIÓN (1-3).</p>	<p>-Vive en un estado de profunda TRISTEZA (1), con frenesí (*) (3) e insania (*) (3), originada muchas veces por el PRURITO de la PIEL (1) (*), de las erupciones suprimidas (1), o DESPUÉS DE LA SARNA (*) (1), que le desencadenan gran ANSIEDAD (1) y lo llevan a tener PENSAMIENTOS tristes (*) (2-1) o ideas suicidas (2-3).</p> <p>-La tristeza se le < antes de la menstruación (1), durante la menopausia (2), por problemas de dinero (1), o por un ACCESO DE TOS (*) (1).</p> <p>-Humor llorón especialmente por la noche (1-3); llora durante el sueño y más en los niños que se agitan toda la noche (1-2-3).</p>	<p>-Se siente triste por su enfermedad o cuando piensa en sus negocios (1).</p> <p>-Es de humor llorón (1). Llora cuando habla de su enfermedad (1) o sin saber por qué o sin causa aparente (1-3); < POR EL CONSUELO (3). Niños muy llorones desde que nacen (*) (1).</p>	<p>-Muy triste, melancólico (1), desalentado (1). Melancolía con marcado estado hipocondríaco (1-3).</p> <p>-La enferma está muy triste, abatida y se queja sin cesar (1-2). -Abatido, desanimado, taciturno y huraño (1-2). Es naturalmente de un carácter apacible, pero ahora está en el borde la locura (1-3).</p> <p>-Se siente abatido, desalentado, como si quisiera mejor morir se que vivir (1-3).</p> <p>-Llorón (1): llora sin motivo alguno (1-3), cuando le hablan (*), no puede remediarlo (1). Por cualquier sufrimiento insignificante llora y se lamenta (1-2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>11- TENDENCIA SUICIDA (3) Y DESESPERACIÓN (3)</p>	<p>-Tendencia al suicidio (3).</p> <p>-Se desespera (3) especialmente por los dolores (3).</p>	<p>-Certeza de muerte durante el escalofrío (*) (3-1). Presiente su muerte con el vómito (*) (3)</p> <p>-Tiene disposición y pensamientos suicidas (2), por una tristeza (1), un DESALIENTO (*) (1) y lo hace dándose un tiro (3).</p> <p>-Se desespera (3) por la más leve crítica (*), por su recuperación y más durante la convalecencia (1).</p> <p>-Se regocija (3) especialmente al anoecer (2) o por la noche (*) (3), y le es indiferente si se va al cielo o al infierno (*) (3).</p>	<p>-Está cansado de vivir (1), pensando y deseando su muerte (2-3), con PENSAMIENTOS y DISPOSICIÓN SUICIDA (3), especialmente por la tristeza (1) y por su gran sentimiento de culpa (1). Manía suicida (3).</p> <p>-Vive DESESPERADO (3), por la mañana (1), por el PRURITO DE SU PIEL (*) (1); por su recuperación y más durante la convalecencia (1). Sufre de desesperación religiosa, por su salvación (3-1). DURANTE LA TIFOIDEA. LA DESESPERACIÓN > DESPUÉS DE UNA EPISTAXIS (*) (3).</p>	<p>-Desea su muerte por la gran debilidad física y mental que siente al despertar (*) (3-1), lo mismo durante los dolores (*) (2).</p> <p>-Tendencia al suicidio (3).</p> <p>-Se siente desesperado (3). DESESPERA DE CURARSE, o por los dolores, desesperanzado (3), desalentado (1), duda de curarse (1), piensa que nunca va a estar bien (1).</p>	<p>-Tendencia al suicidio (3).</p> <p>-Se desespera fácilmente.</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>12- AGRAVACIONES GENERALES</p>	<p>-Por la mañana (1).</p> <p>-Por la tarde (2). .</p> <p>-Al anochecer (2): 18-19 horas (2).</p> <p>-Por el aire frío y húmedo (1)</p> <p>-Por el calor (3).</p> <p>-Por la exposición al sol (3).</p>	<p>-De día (1).</p> <p>-Desde el amanecer hasta el ocaso (1-2).</p> <p>-Por la mañana (1).</p> <p>-A la 10:30 a.m. (*); de 10 a 11 a.m. (*); de 10 a.m. a 1 p.m. (*) y a las 11 a.m. A las 2 p.m. (1).</p> <p>-Por la NOCHE (3): después de ½ noche (3): de 1 a 3 a.m.; a las 3 o 4 A.M. (3).</p> <p>-Por el frío (1): aire; al o después de enfriarse (1). Invierno (1).</p> <p>- Por el tiempo frío seco (1); ó FRÍO HÚMEDO (1).</p> <p>-Por el calor (3); de la cama o de la habitación.</p> <p>-Por la exposición al sol (3).</p> <p>-Por el tiempo seco (2).</p> <p>-Tiempo lluvioso y frío (1).</p> <p>-Antes y durante las tormentas (2).</p> <p>- Por el aire corriente (1) o de la costa. (1).</p> <p>- Por el viento (1).</p> <p>- Por el baño de mar (3).</p> <p>- Por luna creciente (2).</p> <p>- En las montañas (1).</p> <p>-Acostado sobre el lado izquierdo.</p> <p>-Cargado en hombros (1).</p> <p>-Por el tacto (1). Por frotarse (2).</p> <p>-Por la presión (1).</p> <p>-Al estirarse (1).</p>	<p>-Por la mañana (1): y la anochecer (2). A las 10 hs. (1). -Antes del mediodía (1).</p> <p>-Al anochecer (2).</p> <p>-Por la NOCHE: antes y después de medianoche: 1 a.m.; de 1 a 4 a.m.</p> <p>-Por el FRÍO (1): AIRE, inspirar aire frío; al o después de enfriarse; por enfriarse una parte del cuerpo, ir a una habitación fría. Por el frío seco o húmedo. INVIERNO (1).</p> <p>-Por calor y frío (3-1).</p> <p>-Por el calor (3): habitación caliente; cama; estufa; verano.</p> <p>-Por la exposición al sol.</p> <p>-Por cambios de temperatura.</p> <p>-Por el CAMBIO de TIEMPO (2): de FRÍO A CALOR.</p> <p>-Por el tiempo húmedo (1).</p> <p>-Al aire corriente (1). Aire libre (1) [aversión, al (3)].</p> <p>-ANTES, durante y después de una tormenta.</p> <p>-Por el TIEMPO VENTOSO Y TORMENTOSO (2).</p> <p>-Por el viento (1): frío (1).</p> <p>-Por el baño: [AVERSIÓN, AL (3)]. Baño frío (1).</p> <p>-En luna llena o nueva (2).</p> <p>-Acostado (3); sobre el abdomen o el lado derecho.</p> <p>-Por el tacto.</p> <p>-Por la presión de la ropa (1)</p>	<p>-Por la mañana : después del amanecer (1).</p> <p>-Por la tarde (1); 14 h - 14, 15, 16 hs. hasta la mañana (*). (1).</p> <p>-Al anochecer (2): 20 hs. - 20 h a 3 hs (*). Después del ocaso (2).</p> <p>-Por la NOCHE: desde el CREPÚSCULO hasta el AMANECER desde las 18 hasta las 6 horas.</p> <p>-Por el frío (1): al inspirar el aire frío (1); durante el invierno (1).</p> <p>-Por el tiempo helado (1).</p> <p>-Por las aplicaciones húmedas y frías (1).</p> <p>-Por el frío (1) o el calor (3).</p> <p>-Por el calor (3); de la estufa (3), de la cama (3).</p> <p>-Por el calor del verano (3).</p> <p>-Por el sol (3); la insolación.</p> <p>-Por el TIEMPO CALUROSO Y HÚMEDO (3-1).</p> <p>-Tiempo lluvioso (1).</p> <p>- Por el aire de la costa.</p> <p>-A orilla del mar (3)..</p> <p>-Antes y durante y después de las tormentas.</p> <p>-Por el TIEMPO VENTOSO Y TORMENTOSO (2).</p> <p>-Por el viento (1): frío (1).</p> <p>-Por el baño: [AVERSIÓN, AL (3)]. Baño frío (1).</p> <p>-En luna llena o nueva (2).</p> <p>-Acostado (3); sobre el abdomen o el lado derecho.</p> <p>-Por el tacto.</p> <p>-Por la presión de la ropa (1)</p>	<p>-Por la MAÑANA: (1) de 10 a.m. a 3 p.m. (1).</p> <p>-Por la tarde (1).</p> <p>-Al anochecer (2).</p> <p>-Por la noche: a partir de las 3 a.m. (3); de 2 a 5 a.m. (3)</p> <p>-Por el frío: BAÑO FRÍO aire frío [aversión, al (3)]; al o después de enfriarse; por entrar en un lugar frío. Viento.</p> <p>-Por el TIEMPO FRÍO seco o HÚMEDO (1).</p> <p>-Por el calor (3): el calor de la habitación (3). Por aselearse (3). Verano (3).</p> <p>-Por el calor y frío (3-1). Por el tiempo caluroso y húmedo (3-1).</p> <p>-Por LOS CAMBIOS de TIEMPO (2): de FRÍO a CALOR (2); o de calor a frío (3-1).</p> <p>-Por la humedad (1): por el frío húmedo (1). Durante la lluvia (1). Humedecerse los pies (1).</p> <p>-Durante y después de las tormentas.</p> <p>-Por el aire corriente (1): de la costa (3),</p> <p>-Luna menguante (1).</p> <p>-En una habitación cerrada (1).</p> <p>-Por el descanso.</p> <p>-Acostado sobre el lado izquierdo.</p> <p>-Por el tacto.</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM	
<p>12- AGRAVACIONES</p> <p>GENERALES</p> <p>(continuación)</p>	-Por el movimiento (1).	-Por el esfuerzo físico (1). -Por el movimiento: al comenzar el movimiento (1). -Por caminar (1). -Por viajar en tren (1).	-Por el esfuerzo físico : por estirarse (1). -Por el movimiento (1): al empezar el movimiento (1). [Aversión, al (3)]. Al levantarse (1). Al sentarse (1). -Por caminar (1) al aire libre (1). - Montando en carro o a caballo (1). [Aversión a montar en carro (*) (3)]. -Estando de pie. Sentado. -Por el hambre (1). Por ayunar (1).	-Por el movimiento: levantando los brazos lateralmente (1).	-Por el esfuerzo o el ejercicio . -Al movimiento: al comenzar el movimiento (1). Por caminar (1). -Por CAMINAR RAPIDO (2). - Estando de pie (1). Al sentarse. -Por la presión de la ropa (2): [intolerante a las ropas (2)]. -Por la comida caliente (3). El café (1).	
	-Después de comer (3). -Por el huevo (1).	-Antes o después de comer. -Por los dulces (1).	- Después de comer (3): café, harinas, grasa, congelados, carne, dulces, frutas, fruta ácida, leche , verduras, melocotones, pan negro, vinagre o ácidos . -De BEBER COSAS FRÍAS (1). -Por emisión seminal (1).	-Por comidas frías (1) o calientes (3): por el alcohol .		
	-Por la masturbación (2).	-Por la masturbación (2).	-Antes y durante la menstruación (1-2). -Después de sudar (1).	-Antes o durante la menstruación. -Por la pérdida de fluidos (1). - Durante y después la transpiración (1). - Por la SUPRESIÓN DEL SUDOR y MAS de los PIES (1).		-Después de la transpiración . -No lo alivia el sudar (3).
	-Después de las vacunas (2).		-Por la ropa de cama	- Después de la vacunación (2).		-Después de vacunación.
	-Después de desvestirse (1).	-Por la ropa de cama [Intolerancia, a la (2)]. -Al rascarse.	-Por los plumones (2). Al destaparse (1). -Por las secreciones suprimidas (2).			-Después de desvestirse (1).
	-Al hablar o reír (1).		-Por pérdida de sueño (1).	- Antes de defecar (1). -Por la suciedad (1).	-Durante el sueño (3) y después de dormir (3). -Por reír (1).	-Después de dormir (3).

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>13- MEJORIAS GENERALES</p>	<p>-A medida que transcurre el día (2).</p> <p>-Por el frío (3).</p> <p>-Por el tiempo tormentoso (2).</p> <p>-Al aire libre (1).</p> <p>-Aire de la costa (1).</p> <p>-Por un sueño corto (1).</p>	<p>-Al anochecer: a las 9 p.m. Después del ocaso.</p> <p>-Por la noche. (1).</p> <p>-Por el frío : aire [necesita tener las ventanas abiertas].</p> <p>-Por el calor (1).</p> <p>Por el TIEMPO HUMEDO (3).</p> <p>-Por el aire libre (1).</p> <p>-Por el aire de la costa (1). A la orilla del mar (1).</p> <p>-Por el baño (1): de la parte afectada.</p> <p>-Por el baño de mar (2).</p> <p>-Al ser abanicado (1).</p> <p>-ACOSTADO: SOBRE EL ABDOMEN (1)</p> <p>-Por la presión (2). Por frotarse.</p> <p>-Por el movimiento (2): continuado (2).</p> <p>-Por doblar o torcer (2).</p> <p>-Después de comer (1).</p> <p>-Por los ruidos (3).</p> <p>-Después de dormir (1) o de un sueño corto (1).</p> <p>-Por las secreciones (2).</p>	<p>-No se < por el frío.</p> <p>-Por el calor : aire, abrigos.</p> <p>-En el verano (1).</p> <p>-Al aire libre (1). Por el aire corriente (1)</p> <p>-Por el baño (1): frío (3). - Durante o después de las tormentas (3).</p> <p>-Antes del escalofrío (*). (1).</p> <p>-Acostado (1): sobre la cara o sobre el abdomen.</p> <p>-Colgando los brazos lejos del cuerpo (2).</p> <p>-Por la presión de la ropa (2).</p> <p>-Después de comer (1).</p> <p>COMIENDO (1).</p> <p>-Después de beber (1).</p> <p>-Por el estreñimiento (3).</p> <p>-Después de defecar (1)</p> <p>-Por las secreciones.</p> <p>-Durante o DESPUES DE LA TRANSPIRACIÓN (2).</p> <p>-Por rascarse (1).</p>	<p>-Por la mañana después del amanecer (1).</p> <p>-De día (1): a la SALIDA DEL SOL (*) (1).</p> <p>-Por frío: por aplicaciones frías (3)</p> <p>-Por el calor: aplicaciones calientes (1).</p> <p>-Por el aire frío (3).</p> <p>-Por el baño frío (3).</p> <p>-En las montañas (1) o en las zonas mediterráneas (2).</p> <p>-Por el movimiento (2): MOVIMIENTO LENTO o CONTINUADO; o paseando (2).</p> <p>-Cambio de posición (2).</p>	<p>-No se < por el frío.</p> <p>-Por el calor: CALOR DE LA CAMA, o de la estufa [Deseo].</p> <p>-Por el AIRE LIBRE (1):</p> <p>-Por el aire de la costa (1). Por el aire: [necesita tener las ventanas abiertas]. Por el viento (1).</p> <p>-Por el viento frío al conducir su auto (1-3).</p> <p>-Por el baño frío (3).</p> <p>-Estando en reposo (1).</p> <p>-Por el movimiento (2): [deseo, de (2)], o por CAMINAR RÁPIDO (2).</p> <p>-Por la ropa de cama (1). [Deseo, de].</p> <p>-Por vomitar (1).</p> <p>-Frotándose (2).</p> <p>-Al rascarse.</p>
<p>14- CALOR VITAL</p>	<p>-Gran sensibilidad al frío (1).</p> <p>-Sensación de calor (2).</p>	<p>-Es Friolento (1) con TENDENCIA A RESFRIARSE FACILMENTE (1).</p> <p>-BOCHORNOS (2): alternando con escalofríos (1). Sensación de calor en los vasos sanguíneos (2).</p> <p>-Sensación de calor (2): después de comer o de un esfuerzo físico (1).</p>	<p>-Es MUY FRIOLENTO (1), con GRAN TENDENCIA A RESFRIARSE. SIEMPRE TIENE FRÍO y se abriga mucho, usa varias cobijas aún en verano, o mucha ropa interior o sombrero de piel.</p> <p>-Sensación de calor (2).</p> <p>BOCHORNOS (2): al anochecer, que le impiden dormir; al comer; CON SUDORACIÓN (2); COMO SI LE FUERA VERTIDA AGUA CALIENTE (2) y se le extienden hacia arriba.</p>	<p>-No es friolento.</p> <p>-Sin sensación de calor.</p>	<p>-Friolentos; SE RESFRÍAN MUY FÁCIL, SIN SABER CUANDO, COMO NI DONDE (1). <i>“Se resfría cada vez que respira un poco de aire fresco”</i> (1). [Allen]. No termina un resfriado cuando comienza otro.</p> <p>-Sensación de calor (2) general.</p> <p>-Intolerante al calor (2), con OLEADAS DE CALOR (2) y SUDORACIÓN ABUNDANTE (2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
15- LATERALIDAD	-No tiene lateralidad específica.	-Derecha. De derecha a izquierda. Izquierda. -De izquierda a derecha. -Cruzada: derecha superior e izquierda inferior.	-Derecha o izquierda.	-Derecha y después izquierda.	-Derecha.
16 DOLORES Y SENSACIONES	-Dolores: que se presentan en paroxismos (2). Dolores ardientes en general (3). -Sensaciones: de gota que corre por la piel (2). Dolores que se presentan en paroxismos (2). Dolores ardientes en general (3). Sensación de gota que corre por la piel (2).	-Dolores: aparecen de repente (2) y desaparecen gradualmente; localizados en el periostio. Son: ardorosos (3) en los vasos sanguíneos; tirantes (2); calambroideos (3); constrictivos (1-3); contusos (1), como magullado (1); en piquetes (2); incisivos (2); mordientes (3), pungitivos (2), punzantes (2), reumáticos , tractivos (2), terebrantes (3), o desgarrantes (3). -Sensaciones: de vacío (3); de hormiguelo externo (1); de pinchazos (2); de latidos (2); de tensión externa (2); o de viento (2).	-Dolores: aparecen y desaparecen gradualmente (2), se localizan en pequeñas zonas (1). Son especialmente: agudos (2), ardorosos (3), atenzantes (3); calambroideos (3); constrictivos (3); incisivos (2); lancinantes (2); royentes (3), presivos (1), contusos (1), en piquetes (2), tractivos (1), o ulcerativos (3). -Sensaciones: de flacidez (1); de plenitud interna (2); de cama dura (1); de pesadez externa e interna (1); de latido interno (2) y de tirones (2).	-Dolores: NOCTURNOS (3) especial/, COMENZANDO AL ATARDECER Y TERMINANDO AL AMANECER, AUMENTANDO Y DISMINUYENDO GRADUALMENTE EN SU INTENSIDAD, cambiando de sitio con frecuencia y requiriendo frecuentes cambios de posición (2). Dolores erráticos (2). Ya sean óseos o nerviosos, los dolores son LINEARES, y siempre PERSISTENTES y PROFUNDOS. Los huesos duelen al permanecer quieto. Dolores óseos nocturnos, en los huesos largos, en el periostio, en los nervios o en las articulaciones. Dolor ardoroso en los vasos sanguíneos (3), o contuso en los huesos (1). -Sensaciones: de calor en los vasos sanguíneos (2); de viento (2).	-Dolores: aparecen y desaparecen de repente (2). Son: desgarrantes (3); VARIABLES (2), CAMBIANTES (2), erráticos (2), punzantes (2), tirantes (2), contusos (1), en piquetes (2), PUNZANTES (2), o desgarrantes (3). Se localizan especialmente en los huesos o el periostio. -Sensaciones: como de ropa húmeda (1); como si fuera forzado través de una abertura estrecha (1); de hormiguelo externo (1).

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>17- CONCOMITANCIAS</p>	<p>-El Carcinosinum se le puede indicar cuando hay antecedentes de cáncer (3) [sobre todo si hay varios casos en la familia], de TUBERCULOSIS (3), de diabetes y de anemia perniciosa (1), o una combinación de dos o más de ellas. Lo mismo si hay antecedentes de INFECCIONES GRAVES muy PRECOZMENTE (3), en la lactancia o en los primeros meses de vida. En niños con antecedentes de insomnio (3). Especialmente en NIÑOS como remedio constitucional [Foubister].</p> <p>-Puede tener una TRIADA SIGNOLOGICA, que no siempre está presente, y es muy característica, y está representada por: a) Tez de color café con leche; b) Escleróticas azules y c) abundancia de lunares o nevus pigmentarios distribuidos en todo el cuerpo.</p> <p>-Se pueden pensar en él para “la mononucleosis infecciosa aguda; suele ser casi específico” [Foubister], así como en sus secuelas.</p> <p>-Sus síntomas cambian constantemente (2).</p> <p>-Sufre de estados contradictorios y alternantes (3-2). Alternancia de síntomas de una lado al otro del cuerpo (2) [Lac caninum].</p>	<p>-Trastornos: durante la convalecencia (1). POR GONORREA SUPRIMIDA (2). Antecedentes personales de gonorrea (*) (2).</p> <p>-Medorrhinum está indicado cuando el remedio mejor elegido falla en mejorar o curar permanentemente.</p> <p>-IRRITABILIDAD FISICA EXCESIVA (2). FALTA DE REACCIÓN VITAL (1).</p> <p>-Detención en el desarrollo general (1). Enanismo (1).</p>	<p>-Todas sus secreciones [diarrea, leucorrea, menstruaciones, sudores, otorreas, rinorreas, etc.], tiene un MUY MAL OLOR, HORRIBLE, a PODRIDO a CARROÑA (3). Su CUERPO TIENE MAL OLOR (3), aún después de bañarse; pero tiene MIEDO a BAÑARSE (2); aunque está mejor después (1). Generalmente son personas sucias, desaseadas, ofensivas a la vista y al olfato (1-3).</p> <p>-Cronicidad de todas sus enfermedades. FALTA DE IRRITABILIDAD FISICA (1). Tiene una FALTA de REACCIÓN a TODA TERAPÉUTICA (1), medicamentosa o psicológica. FALTA DE EXCITABILIDAD (1). Se le puede utilizar en casos crónicos, cuando los remedios bien seleccionados fallan o no curan de manera permanente (1). O cuando Sulphur parece indicado y no actúa. Especialmente después de una enfermedad aguda, un gran agotamiento O DESPUÉS DE LA SUPRESIÓN DE ERUPCIONES O DE SUDORES (1).</p> <p>-“<i>Psorinum no debe ser prescrito para la psora o la diátesis psórica, sino, como cualquier otro remedio, mediante una estricta individualización y entonces lo veremos realizar su maravilloso trabajo</i>”. [Allen].</p> <p>-Indicado a veces para comenzar el tratamiento de las enfermedades crónicas.</p>	<p>-<i>Rara vez es el mejor remedio para la sífilis per se, pero para la sífilis marcada o suprimida parece restaurar una especie de orden y producir una mejor reacción</i>”. (Kent).</p> <p>-“<i>Sin embargo, aunque la similitud no sea muy evidente, cuando el remedio bien elegido falla para aliviar o curar permanentemente a ENFERMOS SIFILÍTICOS CON ANTECEDENTES PERSONALES O HEREDITARIOS DE SÍFILIS; en toda manifestación mórbida que evoluciona sobre en terreno sifilítico adquirido o hereditario</i>”. (Vijnosky).</p> <p>-“<i>En pacientes sifilíticos que han tenido un chancro localmente y que, como consecuencia, han sufrido de trastornos en piel o garganta durante años, son casi siempre beneficiados por este remedio al comienzo del tratamiento, a menos que algún otro remedio esté claramente indicado</i>”. (Allen).</p> <p>-En niños con sífilis congénita que muestran signos de la enfermedad. En niños o bebés poco desarrollados, arrugados o encogidos y con aspecto de viejos.</p> <p>-En hijos de alcohólicos crónicos.</p>	<p>-SUFRE de TRASTORNOS CONTRADICTORIOS y ALTERNANTES (2-3). Sus síntomas cambian constante/ de una forma rápida (2). Se puede indicar cuando los remedios bien elegidos no actúan (1).</p> <p>-A la cronicidad de sus enfermedades. A las metástasis mórbidas. FALTA DE REACCIÓN VITAL (1). Vigor disminuido (1). Sus heridas curan lentamente (1).</p> <p>-Sus SÍNTOMAS SIEMPRE ESTÁN CAMBIANDO: los trastornos afectan un órgano, luego a otro, comenzando y terminando bruscamente (2).</p> <p>-En los niños: la dentición es lenta o difícil (1). Enanismo (1). Marasmo infantil (3), CHICOS LÁNGUIDOS CON MARASMO, SOMETIDOS A LARGAS PRIVACIONES ALIMENTICIAS. (1-3).</p> <p>-Historia familiar de tuberculosis (3). Se puede pensar en la profilaxis de la tuberculosis.</p> <p>-Irritabilidad física excesiva (2).</p> <p>-A la Enfermedad de Basedow (2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
18-TENDENCIAS (continuación)	<p>-Sin hipertensión.</p> <p>-Sin temblores.</p> <p>-A los tirones al despertar (2-3).</p> <p>-Sin parálisis.</p> <p>-Sin desmayos (3).</p> <p>-Sin hidropesía.</p> <p>-A la emaciación (3).</p>	<p>-Sin hipertensión.</p> <p>-A las convulsiones (3): clónicas, tónicas o epilépticas (3); con espuma en la boca; durante la menstruación (3). Pequeño mal (3). A los estremecimientos (3).</p> <p>-Al temblor externo con adormecimientos (*) (3-1).</p> <p>-Sin parálisis</p> <p>-A los desmayos (3): matinales, al o después de orinar (1). -Al colapso (3).</p> <p>-A la HIDROPESÍA (edema) (2): interna. A la sinusitis (2). -A la hinchazón articular (2).</p> <p>-A la emaciación, especialmente en los niños.</p>	<p>-A la hipertensión (2-3). A las convulsiones: epilépticas; en bebés, o por la supresión de erupciones (1).; con melancolía religiosa (*) o por el ruido (2). Pequeño Mal (3). A la corea (3).</p> <p>-A los temblores: (2) externos por ansiedad (1) o después de una excitación emocional (2).</p> <p>-A las parálisis (3) unilateral por supresión de erupciones (1).</p> <p>-A los desmayos (3), sintiéndose bien antes del ataque (*) (3). A la lasitud (1) en tiempo tormentoso (2). -A la inflamación (2): osteítis, periostitis, adenitis, artritis, hepatitis, serositis, o AMIGDALITIS.</p> <p>-A la hidropesía [edemas] interna o externa. A la hinchazón: de las partes afectadas, de los ganglios con emaciación (3).</p> <p>-A la emaciación o marasmo en niños, con apetito voraz (2) y que se le extiende hacia abajo. A la vejez prematura (3). -A las torceduras al alzarse estirándose (1). -A la estenosis después de una inflamación (3-2). -A la dentición difícil con diarrea (1-2).</p>	<p>-Sin hipertensión. -A las convulsiones epilépticas, sobre todo posmenstruales.(3).</p> <p>-Sin temblores.</p> <p>-A las parálisis de uno de sus lados.</p> <p>-Sin desmayos.</p> <p>-Sin hidropesía.</p> <p>-A la cronicidad en sus síntomas.</p> <p>-A la emaciación. -A la falta de reacción vital (1). -Al desfallecimiento por pérdida de sueño (*). (1).</p> <p>-Al ALCOHOLISMO HEREDITARIO.(3).</p>	<p>-Sin hipertensión.</p> <p>-A las convulsiones : epilépticas (3), clónicas en la cara (3). A la corea (2).</p> <p>-Sacudidas musculares durante el sueño o al ir a dormir (3). -Sin temblores.</p> <p>-Sin parálisis</p> <p>-A los desmayos: durante la cefalea.</p> <p>-A la inflamación (2): adenitis, AMIGDALITIS, sinovitis.</p> <p>-A la EMACIACIÓN con apetito voraz (3-2).</p>
19- SECRESIONES	<p>-No tienen características especiales.</p>	<p>-Aumentadas (2), mucosas (1), verdosas (2), blanquecinas (1), espumosas, fétidas (3) de olor a salmuera de pescado (3).</p>	<p>-Mucosas (2), ofensivas y fétidas (3). ACUOSAS (1), ÁCIDAS (3), mohosas (1), de OLOR a HUEVOS PODRIDOS (3).</p>	<p>-Son purulentas (3), ofensivas (3), verdes o amarillentas (2).</p>	<p>-De olor fétido, pútrido o a queso rancio (3).</p>
20- PERIODICIDAD	<p>-De 13 a 18 horas en la aparición de los síntomas (2)</p>	<p>-Síntomas que aparecen cada día (2).</p>	<p>-Días alternos (2); cada dos días; cada dos o tres semanas (2), cada cuatro a cinco semanas o cada año (2). Durante nueve meses, cuatro u once años.</p>	<p>-Sin periodicidad.</p>	<p>-Síntomas que aparecen a la misma hora, cada 7, 14, 21 o 28 días (2).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>21- DESESOS (2) AVERSIONES (3) ALIMENTICIAS.</p> <p>SED (2).</p>	<p>-Deseos (2): de grasa, mantequilla, jamón graso, leche, chocolate, pastelería, huevos, sal, dulces, azúcar, especias, frutas y de agua fría.</p> <p>-Aversiones (3): grasa, leche, huevos, la sal, y por las frutas.</p> <p>-Sed: poca.</p>	<p>-Deseos : de grasa, mantequilla, jamón graso, leche, chocolate, pastelería, huevos, sal, dulces, azúcar, especias, frutas y de agua fría.</p> <p>-Aversiones: grasa, leche, huevos, la sal, y por las frutas.</p> <p>-Sed: intensa y constante, hasta sueña que está bebiendo (2).</p>	<p>-Deseos: de alcohol, cerveza; de cosas indigeribles: carbón vegetal, carbón, cal pizarra, tierra, tiza, arcilla (3); de exquisitices, o de ácidos y de agua fría.</p> <p>Aversiones: al alcohol; a la comida cocinada o caliente; al cerdo y a los tomates. Aversión a la comida teniendo hambre (3). Al tabaco, a fumar su cigarrillo de costumbre por la mañana (*).</p> <p>-Sed: poca.</p>	<p>-Deseos: de bebidas alcohólicas (2-3) en cualquiera de sus formas.</p> <p>-Aversión: a la carne.</p> <p>-Sed: de grandes cantidades de líquido repetidos con gran frecuencia (2).</p>	<p>-Deseos: de comer demasiado (2); de EXQUICITECES; carne, CARNE AHUMADA; picantes, especias; cosas refrescantes; grasa, mantequilla, cerdo, jamón graso, tocineta; dulce, sal leche fría; leche, leche fría; alcohol y de GOLOSINAS o BOCADOS EXQUISITOS; de bananas; papas. De agua fría durante los escalofríos o la fiebre (*); helados o de bebidas calientes</p> <p>-Aversiones: a la carne; leche fría; vino o al dulce. A la comida aún teniendo hambre (3).</p> <p>-Sed: Extrema, ardiente matinal (2-1). Sed de pequeñas cantidades de agua fría (2-1). SED DURANTE LOS ESCALOFRÍOS Y LA FIEBRE (2-1).</p>
<p>22- SUEÑO Y SUEÑOS.</p>	<p>-Sueño inquieto (2) y perturbado (2). Demora en conciliar el sueño por gran aflujo de ideas (2).</p> <p>-El niño duerme en una posición característica, GENUPECTORAL o de oración mahometana [Medorrhinum]. También lo hace de espalda, con los brazos sobre la cabeza [Pulsatilla].</p> <p>-INSOMNIO (3), está despierto casi toda la noche (3). [Foubister].</p> <p>-Se despierta con estremecimientos (3).</p> <p>-Sueños: excitantes (2), vívidos (2); con muertos, velorios, cementerios, asesinatos o con hechos del pasado.</p>	<p>-Esta dormido, pero oye y contesta preguntas como si estuviera despierto (2).</p> <p>-Solo puede dormir de espalda y con las manos sobre la cabeza o en posición mahometana.</p> <p>-El niño duerme arrodillado boca abajo en posición mahometana, con la cara hundida en la almohada. Esta posición le alivia muchos de sus síntomas: disnea, gastralgia, tos, etc.</p> <p>-Insomnio antes de la media noche (3) de las 6 p.m. a las 12 p.m. (*).</p> <p>-Sueños: horribles (3), con fantasmas, muertos, o que esta bebiendo o caminando.</p>	<p>-Sueño inquieto , más en los niños. Rechina dientes durmiendo (2). Se despierta por los sueños (3-2).</p> <p>-Somnoliento todo el día (1); se duerme sentado (1) o después de comer (1).</p> <p>-Sonambulismo (2-3), ejecutando actos peligrosos (3).</p> <p>-INSOMNIO por PRURITO (3-1) o por congestión en la cabeza (*). Insomnio en los niños (3)</p> <p>-Sueños: angustiosos (3), penosos (1), terroríficos (3); con ladrones, peligros, viajes, sus planes o ocupaciones.</p>	<p>-Gran inquietud nocturna con imposibilidad de mantener la pierna en una posición (2-3). Insomnio absoluto (3).</p> <p>-Despierta inmediatamente después de media noche y no se puede dormir de nuevo hasta las 6 a.m.</p> <p>-INSOMNIO.</p> <p>-Sueños: No tiene.</p>	<p>-Sueño turbado, no puede dormir por pensamientos abundantes, o por la tos (3). Se despierta después de media noche a las 3 a.m. (3), por los sueños o llorando de terror (*).</p> <p>-Somnolencia matinal o después de comer (1-3).</p> <p>-Insomnio por la tos (3-1).</p> <p>Sueños: aterradores (3), de vergüenza (1); con la desgracia de su familia (*) (1); con muertos, y con serpientes. Pesadillas (3).</p>

SÍNTOMA	CARCINOCINUM	MEDORRHINUM	PSORINUM	SYPHILINUM	TUBERCULINUM
<p>23- FIEBRE ESCALOFRÍOS Y SUDOR.</p>	<p>-“Fiebre: con agotamiento” (2-3). “Escalofríos en manos y pies con cefalea congestiva, mialgias y artralgias y cansancio” (1-2-3). [Rosario Sánchez].</p> <p>-Escalofríos: pocos.</p> <p>-Sudor: profuso nocturno (2-3).</p>	<p>-Fiebre con o sin sed (2-1); con sudor profuso en la cara (2); con inquietud desde las 12 p.m. a las 3 a.m. (2-3). Somnolencia durante la fiebre (1-3). -Calor ardoroso en el cuerpo (2-3); la sangre parecer quemar en los vasos (3).</p> <p>-Escalofríos antes de orinar o cuando tiene urgencia (1-2), que > después; o los presenta también después de orinar (3), Escalofríos nocturnos que suben y bajan por la espalda (3-1), de 3 a 4 p.m. (1).</p> <p>-Sudor: abundante nocturno (2-3).</p>	<p>-Fiebre con delirio (2-3) SIN SUDOR (3).</p> <p>-Escalofríos: en PRIMAVERA o VERANO (1-3); de PERIODICIDAD IRREGULAR. -PALUDISMO CRÓNICO (3).</p> <p>-Sudor: de OLOR PUTRIDO ó ACIDO, < A LAS 3 A.M. (3), al AIRE LIBRE (1), por el menor esfuerzo (1) o caminando (1). Trastornos por SUPRESION DE SUDORES (1). Sudores CALIENTES (2). -Suda abundantemente después de enfermedades agudas (2), con > y alivio de todos sus síntomas (1).</p>	<p>-Fiebre: seca, ardiente, muy poco después de acostarse, con labios apegaminados, gran sed (2). Durante la fiebre ardiente el enfermo quiere tirar lejos las cobijas, saca los pies fuera de la cama y quiere refrescarlos apoyándolos contra la pared. (2). -Fiebre de las 11 a las 13 horas, diariamente. Fiebre enseguida de acostarse, con gran sed (2); todos los días de las 23hs.a 1 hs. (3).</p> <p>-Escalofríos: pocos.</p> <p>-Sudor: profuso de noche (2-3), estando desvelado o intranquilo, especialmente entre los omoplatos y debajo de la cintura. Sudoración abundante de noche con gran debilidad. (2-1).</p>	<p>-Fiebre: Insidiosa, intermitente (2), crónica.; con escalofríos, estremecimientos o aversión a descubrirse (1-2-3); por destaparse su cuerpo o sus manos (1).</p> <p>-Escalofríos: pocos.</p> <p>-Sudor: abundante nocturno (2-3). Diurno por el menor esfuerzo físico o mental (2-1). Le mancha la ropa de amarillo (2).</p>

Signos y siglas empleados:

- ⇒ **Valor de los síntomas:** (3): aquellos escritos en LETRA MAYÚSCULA RESALTADA; (2): aquellos escritos en letra minúscula resaltada; y los de (1): escritos con letra minúscula.
- ⇒ **Símbolos utilizados:** (<): agravación; (>): mejoría; (dur.): durante; (desp.): después; (1/2): medio; (p/p): principalmente; (X): por; (*): síntoma único del medicamento.

(1): Síntoma psórico; (2): Síntoma sycósico y (3): Síntoma syphilitico

BIBLIOGRAFÍA

- ALLEN, H.C. 1910. Materia Médica de los Nosodes. Imprenta de J. Huguet Bosch, Sucesor de Inglada & Comp. Barcelona.
- BARTHEL, H. 1979. Synthetic Repertory. Volúmenes I, II y III. Berlín.
- BOERICKE, O.E., 1927. Pocket Manual of Homoeopathic Materia Medica. 9th Edition Boericke & Runyon. New York.
- CLARKE, J.H., 1962. A Dictionary of Practical Materia Medica. Volume I, II, and III. Health Science Press. Rustington, Sussex. England.
- FOUBISTER, D.M., 1954. Clinical Impresions of Carcinosis. British Homeopathic Journal 44, IV-1954 y trabajos posteriores). London.
- LA HOMEOPATIA EN EL MUNDO, 1997. Carcinosinum Patogenesis completa. Año 47. Número 1. Homeopatía de México A.C.. México.
- HERING, C. 1888 Guiding Symptoms of our Materia Medica Jain Publishers. New Dehli.
- HOMEOPATÍA DE MÉXICO, A.C. 1984. Miasmas. Memoria Primera Asamblea. México D.F.
- KENT, J.T. 1983 Materia Médica Homeopática. Tomo I y II. Editorial Albatros. Buenos Aires.
- KENT, J.T. 1980 Kent's Final Repertory of the Homeopathic Materia Médica. Revised, corriged, aumtented and edited by Pierre Schmidt and Dr. Diwam Marusch Chand. Nat. Homeopathic Pharmacy. New Delhi.
- RED RADAR, 1998. Homeopathic Software. Bélgica.
- RIVEROS, C., 1993. Repertorio de síntomas de los Nosodes Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum y Tuberculinum que no están consignados en los Repertorios de Kent y de Barthel. Instituto Homeopático Luis G. Paéz. Bogotá. D.C.
- RIVEROS, C., 2000. Definición y Clasificación Miasmática de los Síntomas Generales del Repertorio Síntesis. Farmacia Homeopática Néstor Riveros V. Bogotá D.C.
- RIVEROS, C., 2005. Materia Médica Miasmática Homeopática. Fundación Médica Homeopática Colombiana “Néstor Riveros Valderrama”. Bogotá D.C.
- RIVEROS, N. 1968 a 1995. Conferencias sobre los fundamentos de la Homeopatía. Instituto Homeopático Luis G. Paéz. Bogotá. D.C.
- RIVEROS, N., 1986. Traducción, Significado y Clasificación Miasmática de los Síntomas Mentales del Repertorio de Barthel. Bogotá D.C..
- SANCHEZ-ORTEGA, P. 1977. Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann. Primera Edición. Biblioteca de Homeopatía de México A.C.. México D.F.
- SANCHEZ-ORTEGA, P. 1992. Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica. Primera Edición. Talleres Novarte, S.A de C.V. México. D.F.
- SANCHEZ ORTEGA, P., 1996. Traducción y definición de los síntomas mentales del Repertorio Sintético de Barthel. Primera edición. Biblioteca de Homeopatía de México A.C. México D.F.
- VIJNOVSKY, B., 1981, Tratado de Materia Médica Homeopática. Tomo I, II y III.. Talleres Gráficos Zlotopioro S.A.C.I.F., Buenos Aires.

Dr. Carlos Riveros Gómez M.D. (e. mail: carlosriveros@supercabletv.net.co)

Bogotá, D.C., Agosto 12 de 2006.